

適用科別班級： 5N501-512

學制：  五專  二專

評分：

命題教師： 古玉幸

時間：  一般日  夜間班  假日班

班級： \_\_\_\_\_ 學號： \_\_\_\_\_ 姓名： \_\_\_\_\_

\*選擇題：80 題，每題 1.25 分，滿分 100 分 命題範圍：全冊

- (B) 1. 曾太太因子宮肌瘤進行子宮切除術，手術後哀怨地說：「我這樣已經不算是女人了，我擔心我先生會不會因為這樣不愛我了！」此時曾太太最需要滿足的是什麼需求？(A) 生理 (B) 愛及歸屬感 (C) 自尊 (D) 自我實現。
- (A) 2. 醫院組成靜脈注射小組，負責全院病患之靜脈注射，屬下列何種護理模式？(A) 功能性護理 (B) 成組護理 (C) 全責護理 (D) 個案護理。
- (C) 3. 護理理論之主要目的旨在滿足病患之自我照護需求，此為何者之護理理論？(A) 紐曼 (Neuman) (B) 羅伊 (Roy) (C) 歐倫 (Orem) (D) 羅傑士 (Rogers)。
- (A) 4. 「每 2 小時協助病人翻身 1 次」是屬於下列何種護理功能？(A) 獨立性護理功能 (B) 相依性護理功能 (C) 非獨立性護理功能 (D) 醫囑性護理功能。
- (B) 5. 有關鋪床之注意事項，下列何者正確？(A) 應遵守外科無菌原則 (B) 橡皮中單上應再加鋪布中單 (C) 應使用肩部力量，而非手肘小肌肉力量 (D) 鋪床後應將床鋪搖高固定。
- (B) 6. 為了增加憂鬱病人興奮刺激作用，應布置下列何種色系的環境？(A) 粉紅色 (B) 米黃色 (C) 水藍色 (D) 墨綠色。
- (B) 7. 當醫院出現火災時，有關護理師在疏散病患的處置，下列敘述何者錯誤？(A) 啟動火災警報器，安撫病患不要慌張 (B) 指示能行走的病患趕緊搭電梯離開 (C) 教導病患將毛巾沾溼覆蓋口鼻呼吸 (D) 利用床單拖拉法來搬運長期臥床病患。
- (C) 8. 預防病人跌倒，下列措施何者正確？(A) 調高病床高度，使病人有較好的視線 (B) 靠牆的床欄可以不必拉上，方便照顧 (C) 病人使用後的便盆椅，宜放置浴室內 (D) 輪椅應打開置於床尾，方便隨時使用。
- (A) 9. 一位罹患先天性心臟病病童的母親不停的抱怨：「這孩子怎麼這麼命苦！將來的日子還那麼長，他該怎麼辦！」下列何者是護理師最適宜的處置？(A) 傾聽 (B) 鼓勵她面對現實 (C) 告知她目前醫療科技日新月異，不用太擔心 (D) 和她一起盡早為病童擬定照護計畫。
- (B) 10. 有關評估的敘述，下列何者錯誤？(A) 視診是一種重要的觀察法 (B) 觸診主由指尖進行資料收集 (C) 叩診是評估胸腔的常用方法 (D) 嗅覺常用於分辨分泌物的氣味。
- (B) 11. 要達到正確觀察時必須符合下列哪些條件？①擬定觀察計畫②加入主觀的判斷③不要預設目的④病患入院即持續進行。(A) ①② (B) ①④ (C) ②③ (D) ③④。
- (A) 12. 乳癌病人主訴乳頭有黃色滲液流出，此時護理人員採取的觀察方法，下列何者最合宜？(A) 參與性觀察 (participant) (B) 間接觀察法 (indirect observation) (C) 自省性觀察 (introspectionist) (D) 旁觀性觀察 (spectator)。
- (B) 13. 護理人員應隨時注意觀察病人的症狀 (symptoms) 與徵象 (signs)，下列哪些項目屬於症狀？①軟弱無力②脈搏變慢③臉色蒼白④血壓上升。(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④。
- (C) 14. 下列何者不是長期醫囑 (standing order)？(A) ampicillin 1# (250 mg) P.O. q6h (B) demerol 50 mg I.M. q4h p.r.n. (C) glycerin enema 100 mL S.O.S. (D) ativan 1# (0.5 mg) P.O. h.s.。
- (D) 15. 下列何者為治療處方註明的「O.D.」？(A) 左耳 (B) 右耳 (C) 左眼 (D) 右眼。
- (D) 16. 陳先生血糖不穩定，order：q.o.d. check F/S，此表示應多久測 1 次血糖？(A) 每天 (B) 每小時 (C) 每 4 小時 (D) 每 2 天。
- (A) 17. 有關給藥常用縮寫之中文意義，下列何者錯誤？(A) 飯後：a.c. (B) 睡前：h.s. (C) 停用：DC (D) 口服：p.o.。

情況：林小弟因高燒不退，抽搐住院，被診斷出罹患腦膜炎。依此回答下列二題。

- (B) 18. 林小弟需採何種隔離方式？(A) 絕對隔離 (B) 呼吸道隔離 (C) 接觸隔離 (D) 分泌物隔離。
- (B) 19. 護理師在照顧林小弟時，應採取何種隔離防護措施？①洗手②穿隔離衣③戴手套④戴口罩。(A) ①② (B) ①④ (C) ②③ (D) ③④。
- (D) 20. 對降低院內感染之措施，下列何者最適宜？(A) 替病人傷口換藥時，應邊對其說話邊換藥 (B) 開放性肺結核病人只要不咳嗽，可不必戴口罩 (C) 非罹患傳染性疾病的病人，引流液應不必視為感染性物質 (D) 處理所有病人的傷口或檢體，均應戴上手套。
- (D) 21. 院內感染的敘述，下列何者正確？①主要菌種是大腸桿菌②住院病人靜脈注射部位出現化膿現象③與抗生素濫用有關④洗手是最簡單有效防止感染的方法⑤最常見的院內感染是呼吸道感染。(A) ①②⑤ (B) ①③⑤ (C) ②④⑤ (D) ②③④。
- (B) 22. 有關清潔法之敘述，下列何者正確？(A) 橡皮類應用煮沸熱水清洗消毒 (B) 新汙染的血漬應用冷水或氨水清洗 (C) 傳染性的布單應放入隔離包清洗後再消毒 (D) 使用過氧化氫溶液 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 清洗指甲油汙漬。
- (C) 23. 李先生因嚴重車禍致右大腿下截肢，術後傷口疼痛採自控式止痛後疼痛獲緩解，頻問自己是否為沒用的人、換藥時不願看自己傷口、甚至拒絕訪客。下列何者是李先生目前待解決的主要護理問題？(A) 疼痛 (B) 焦慮 (C) 身體心像改變 (D) 活動功能障礙。
- (A) 24. 有關護理目標及預期成果之敘述，下列何者錯誤？(A) 必須反映出護理師之獨特功能 (B) 目標必須是可觀察、可測量的 (C) 必須是有期限的 (D) 必須是切合實際的。
- (C) 25. 下列何者為客觀資料？(A) 病人：「我覺得肚子好痛呀！好想吐！」 (B) 看護：「我覺得病人的血壓可能有 180。」 (C) 護理人員：「病人的臉色蒼白、冒冷汗。」 (D) 家屬：「他飯吃得很少，青菜一口都不吃。」
- (A) 26. 下列何者是初級來源 (primary source) 的健康資料？(A) 病人：「我昨晚翻來翻去，整夜沒睡。」 (B) 家屬：「他

- 一換新環境就整夜睡不著。」 (C) 護理人員：「他整夜都在擔心手術的事。」 (D) 護理記錄：「病人半夜嘔吐後未再入睡。」
- (B) 27. 護理評值的內容，除了日期及成果目標達成程度，還需要包含下列何者？(A) 護理活動的執行情況 (B) 護理對象表現的具體行為 (C) 護理計畫的擬訂 (D) 護理技術的自我評估。
- (D) 28. 護理師為女性病人執行會陰沖洗及導尿時，應協助其採用下列何種姿勢？(A) 辛氏臥式 (B) 膝胸臥式 (C) 截刀臥式 (D) 屈膝仰臥式。
- (C) 29. 林小弟 5 歲，使用手肘約束帶，護理師宜注意之事項包括：①雙手宜握毛巾捲②約束帶之繩子以平結綁好③宜穿長袖上衣④禁止使用安全別針，以免受傷。(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④。
- (D) 30. 約束病人肢體時，病人肢體出現蒼白、麻木、冰冷之立即處置，下列何者正確？(A) 通知醫師處理 (B) 覆蓋毛氈以保暖(C) 給予肢體按摩 (D) 鬆綁約束帶。
- (A) 31. 下列何者不適宜給予按摩？(A) 血栓症 (B) 腹部手術後 (C) 老年人 (D) 脫水者。
- (B) 32. 長期臥床病患易導致壓瘡的主要原因為何？(A) 血液黏稠度增加，以致靜脈血滯留 (B) 血管受壓迫，阻斷局部組織血液之供應 (C) 胸部擴張受限，以致血氧過低 (D) 心臟負荷減少，血壓降低所致。
- (B) 33. 皮膚護理使用 50%酒精按摩的目的為下列何者？(A) 消毒散熱 (B) 涼爽舒適 (C) 柔軟彈性 (D) 減少過敏。
- (A) 34. 能使肌肉長度伸縮及關節移動，但肌肉張力不變的運動稱為：(A) 等張運動 (B) 等長運動 (C) 無氧運動 (D) 有氧運動。
- (D) 35. 為預防下肢行皮膚牽引病患發生血栓靜脈炎，可教導病患執行何種活動？(A) 等張運動 (B) 被動運動 (C) 協助性主動運動 (D) 等長運動。
- (D) 36. 王老太太因中風左側肢體偏癱，護理師執行其患側肢體活動的主要目的，不包括下列何者？(A) 預防肌肉萎縮 (B) 維持關節活動 (C) 避免關節攣縮 (D) 緩解肌肉疼痛。
- (A) 37. 周小姐因下肢骨折接受長腿石膏固定，護理人員教導她執行患肢股四頭肌收縮運動，其主要目的為何？(A) 預防肌肉萎縮(B) 促進關節活動 (C) 增加血管硬度 (D) 加強骨質密度。
- (C) 38. 護理人員教導病人做凱格爾氏運動 (Kegel's exercise) 以改善尿失禁，此為何種運動？(A) 等張運動 (B) 反射運動 (C) 等長運動 (D) 混合運動。
- (A) 39. 下列何項是睡眠過程中的生理變化？(A) 基礎代謝率下降 (B) 血壓上升 (C) 周圍血管收縮 (D) 血糖值上升。
- (B) 40. 張先生於住院期間，經常受到護理人員推車輪子轉動聲音的干擾，以致夜間睡眠常被打斷，張先生於白天可能出現哪些症狀？①嗜睡②疲憊③反應遲鈍④臉上皺紋增加⑤很快再進入深睡狀態。(A) ①②④ (B) ①②③ (C) ③④⑤ (D) ①②⑤。
- (A) 41. 陳女士因發燒入院治療，昨天體溫最高為 39.8°C，最低是 37.6°C，此種體溫變化的特性屬於下列哪一種發燒型態？(A) 弛張熱 (remittent fever) (B) 間歇熱 (intermittent fever) (C) 恆常熱 (constant fever) (D) 回歸熱 (relapsing fever)。
- (B) 42. 因為心收縮力減弱，使心搏出量減少，造成脈搏壓下降，下列何者為此時所觸摸到的脈搏？(A) 洪脈 (bounding pulse) (B) 弦脈 (wiry pulse) (C) 絲脈 (thready pulse) (D) 交替脈 (pulse alternans)。
- (A) 43. 下列何種情況會導致心搏過速？(A) 缺氧 (B) 體力衰竭 (C) 顱內壓升高 (D) 血壓上升。
- (A) 44. 有關呼吸速率增加的情況，下列何者錯誤？(A) 血壓突然上升(B) 體溫上升 (C) 急性感染 (D) 焦慮。
- (D) 45. 李先生右手靜脈注射中，左手石膏固定，下列何者為理想測量血壓的部位？(A) 肱動脈 (B) 股動脈 (C) 橈動脈 (D) 臑動脈。
- (C) 46. 有關腳踝扭傷的護理，下列何者正確？(A) 受傷 24~48 小時內應冷敷，以促進肌肉鬆弛，減輕疼痛 (B) 受傷 48 小時後應熱敷，以減輕炎症反應 (C) 可立即使用毛巾裝碎冰，直接在患部進行溼冷敷 (D) 可使用烤燈，直接對著傷處進行熱療。
- (C) 47. 有關不宜用熱的情況，下列何者正確？(A) 女性經痛熱敷下腹部 (B) 糖尿病人足部使用溫水泡腳 (C) 腦血管疾病病人頭部置放熱水袋 (D) 痔瘡術後使用溫水坐浴。
- (A) 48. 有關用冷的敘述，下列何者正確？(A) 溫水拭浴是一種冷療法(B) 用冷時間愈久，組織對冷覺的敏感度愈好 (C) 對於減輕組織腫脹或充血的成效不佳 (D) 冰塊直接置於皮膚上不可超過 5 分鐘。
- (B) 49. 下列何種飲食適用於無法由口咀嚼或吞嚥食物的病人？(A)清流質飲食 (B)全流質飲食 (C)軟質飲食 (D)細碎飲食。
- (B) 50. 有關成人鼻胃管插入時注意事項的敘述，下列何者錯誤？(A) 插入長度約為 45~55 公分 (B) 插入長度可測量鼻尖到劍突之長度 (C) 插入時讓病人的頭部稍向胸前微屈 (D) 鼻胃管進入口咽部時指引病人做吞嚥動作。
- (A) 51. 林小姐行腹腔手術前，需採用低渣飲食，下列何者是其可以進食的食物？(A) 白粥 (B) 熱燕麥粥 (C) 加牛奶的咖啡 (D) 果菜汁。
- (A) 52. 張太太為 B 型肝炎帶原者，其表面及核心抗原均呈陽性反應 [HBsAg (+)、HBeAg (+)]，其新生兒出生 24 小時內應注射一劑 B 型肝炎免疫球蛋白，下列何者為注射此藥物的目的？(A) 預防疾病 (B) 減輕症狀 (C) 治療疾病 (D) 維持正常生理功能。
- (C) 53. 有關皮下注射目的之敘述，下列何者正確？(A) 藥物是經由皮下脂肪組織吸收作用 (B) 注射具刺激性藥物，並可防止受消化液破壞 (C) 皮下組織是介於真皮層及肌肉組織之間，以慢慢吸收達療效 (D) 藥物作用速度較口服及肌肉注射快。
- (C) 54. 將三種不同的注射法排序，依作用速度由快至慢之排列順序為何？①肌肉注射②皮下注射③靜脈注射 (A) ①>②>③ (B) ③>②>① (C) ③>①>② (D) ①>③>②。
- (C) 55. 給藥時誤將給 A 床靜脈注射的抗生素藥物給 B 床。此時的立即處置下列何者正確？(A) 觀察病患有無合併症再決定 (B) 鼓勵病患多喝開水，以減輕毒性 (C) 立刻告知相關人員並觀察病患情況 (D) 請病患有不舒服立刻告知。

- (B) 56. 病人因點滴輸液滲漏，使用黃藥水敷於患處之方式，下列何者正確？(A) 乾冷敷 (B) 溼冷敷 (C) 乾熱敷 (D) 溼熱敷。
- (A) 57. 病人在輸血過程中，出現心跳加速、血壓下降及解血尿情形，應立即採取下列何種措施？(A) 停止輸血 (B) 減慢輸血速度後再觀察 (C) 聯絡醫師給與抗組織胺藥物 (D) 與血庫再次確認病人血型無誤。
- (C) 58. 由靜脈以一般輸液套管給 0.33% 葡萄糖溶液 1,000 mL，預計 5 小時輸注完畢，下列何者為正確滴注速度？(A) 30 滴／分 (B) 40 滴／分 (C) 50 滴／分 (D) 100 滴／分。
- (D) 59. 在未輸入體內前，靜脈輸注液體，下列何者屬於低張性溶液？(A) 10% 葡萄糖溶液 (B) 5% 葡萄糖溶液 (C) 乳酸鹽林格氏溶液 (D) 2.5% 葡萄糖溶液。
- (C) 60. 白先生手術後需禁食，下列何種靜脈輸液可以補充熱量？(A) 乳酸鹽林格氏溶液 (B) 0.45% 食鹽水溶液 (C) 臺大 5 號 (Taita No.5) (D) 林格氏溶液。
- (A) 61. 照護主訴無法解尿的病人，護理師可獨立自主使用的誘尿方法包括：①讓病人聽流水聲②讓病人手握冰塊③為病人執行會陰沖洗④在病人膀胱部位放置熱水袋熱敷。(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④。
- (D) 62. 有關執行成人大量灌腸技術的敘述，下列何者正確？①適當的肛管尺寸為 14~18 Fr. ②肛管插入的深度為 7.5~10 cm③灌腸筒液面高度與肛門的垂直距離約 45~60 cm④灌完後請個案盡量忍住便意 5~10 分鐘。(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④。
- (B) 63. 有關糞便顏色的敘述，下列何者錯誤？(A) 綠色的糞便可能為腸道感染 (B) 食用甜菜會使糞便成黑色 (C) 服用鐵劑會使糞便成柏油色 (D) 膽道阻塞時，會有灰白色糞便。
- (A) 64. 病患陳先生，預做直腸攝影，而服用鋇劑，則其檢查後的糞便可能呈現何種顏色？(A) 灰白色 (B) 黃色 (C) 暗紅色 (D) 黑色。
- (B) 65. 有關保留灌腸 (retention enema) 的敘述，下列何者錯誤？(A) 溶液溫度為 38~41°C (B) 0.2% 肥皂水為最佳的溶液選擇 (C) 所使用的溶液量一般不超過 240 c.c. (D) 溶液保留在腸道的時間約為 15~30 分鐘。
- (C) 66. 下列何者不適宜給予灌腸？(A) 脹氣 (B) 幼兒 (C) 產科安胎 (D) 習慣性便秘。
- (C) 67. 洪老太太接受全膝關節置換術，目前患肢彈性繃帶包紮固定中，護理師若觀察到肢體出現何種徵象，應鬆開繃帶觀察？(A) 足背動脈搏動強度 2+ (B) 腳趾可以屈曲伸展 (C) 抱怨末梢麻木刺痛感增加 (D) 末梢溫暖、微血管回填 < 3 秒。
- (D) 68. 使用多頭帶包紮腹部，以協助產後惡露排出之方法為下列何者？(A) 先右後左交叉緊塞 (B) 先左後右交叉緊塞 (C) 由下往上傾斜包紮 (D) 由上往下傾斜包紮。
- (C) 69. 李先生接受左膝關節上方的截肢手術，術後左腿截肢部位最合適的包紮方法為：(A) 急螺旋型包紮法 (B) 人字型包紮法 (C) 回反摺型包紮法 (D) 8 字型包紮法。
- (A) 70. 死亡後，通常人體哪個部位會最先發生肌肉僵硬？(A) 下顎 (B) 軀幹 (C) 手臂 (D) 下肢。
- (B) 71. 依據哈佛腦死標準，下列何者不能作為死亡判定的依據？(A) 腦波圖呈一直線 (B) 心跳停止、瞳孔放大 (C) 無自然呼吸、無肌肉活動 (D) 對刺激無感受、無反應。
- (D) 72. 協助陳先生出院當天準備之敘述，下列何者錯誤？(A) 與陳先生清點交還公物 (B) 領取出院許可證即可辦理出院手續 (C) 提醒陳先生及家屬出院相關護理指導項目 (D) 協助出院前測量身高以建立離院前之基本資料。
- (D) 73. 有關尿液培養的敘述，下列何者正確？(A) 檢查目的是測腎小管再吸收能力 (B) 應收集 24 小時尿液量 (C) 水腫病患禁做 (D) 可作為抗生素選用的指標。
- (D) 74. 王小姐目前有服用 rifampin 藥物，其尿液顏色會有下列何種改變？(A) 變為黑褐色 (B) 變為青綠色 (C) 變為螢光黃色 (D) 變為橙色。
- (C) 75. 有關術後第一天傷口的照顧，下列敘述何者正確？(A) 禁止熱敷，因術後傷口感覺功能受損，容易燙傷 (B) 必須熱敷，因術後傷口循環功能不良，熱敷可促進傷口癒合 (C) 禁止熱敷，因可能增加出血與傷口腫脹 (D) 必須熱敷，可促進傷口排膿，並有止痛的效果。
- (C) 76. 有關收集痰液檢體過程，下列何項錯誤？(A) 收集清晨醒來未清潔口腔、未進食前之痰液 (B) 確認病患咳出的為痰液非唾液 (C) 若病患覺得口乾，可先以漱口水漱口 (D) 無法自咳痰液者，可利用抽吸方式收集。
- (B) 77. 自動出院 (A.A.D.) 是指：(A) 病患情況已穩定，醫師通知他可以出院 (B) 醫師認為病患仍需留院治療，但他要求出院 (C) 病患住院期間死亡，醫師開立證明完成出院 (D) 病患有意願到他院治療，醫師接受辦理出院。
- (A) 78. 林小妹 1 歲 3 個月，給予肌肉注射時，最理想的注射部位為下列何處？(A) 股外側肌 (B) 上臂三角肌 (C) 背臀肌 (D) 腹臀肌。
- (B) 79. 醫生為 25 床張小玉小姐開立臨時醫囑「1,300 penicillin skin test」後，護理人員於下午 1 點 10 分以空針抽取 penicillin 1 vial (5 c.c.) 為 25 床張小玉小姐執行肌肉注射。上述給藥過程，護理人員違反了哪幾項給藥的「五對」原則？①時間②劑量③途徑④藥物⑤病人。(A) ①① (B) ②③ (C) ③④ (D) ④⑤。
- (C) 80. 有關臨終病患呈現的生理徵象，下列何者錯誤？(A) 臉部肌肉失去張力產生希氏面容 (Facies Hippocratica) (B) 出現潮氏呼吸 (Cheyne-Stokes respiration) (C) 聽覺是最早消失的感覺器官 (D) 脈搏漸轉弱出現絲脈。